

живо тегло е свързано със генотипа на черноглавата Плъвенска овца и тъкмо за това овцетѣ отъ другитѣ околии, въ които е влѣта повече кръвь отъ черноглавата овца, иматъ срѣдно живо тегло близко до това на последната. Срѣднитѣ живи тегла на контролиранитѣ овце въ Търновска, Свищовска, Еленска, Троянска и Никополска околии сж подъ срѣднитѣ норми, предвидени въ правилника за признатитѣ отъ държавата за „развъдни стопанства“. Високитѣ норми за живото тегло, предвидени въ правилника сж главната прѣчка, за да не бждатъ много отъ стадата, въ тѣзи околии, признати за развъдни, макаръ, че сж показали млѣчна производителность и вълнодайность много по-висока отъ изискуемитѣ се срѣдни минимални норми. Така напримѣръ: отъ контролиранитѣ 14 овчи стада въ Търновска околия нито едно не е признато за развъдно, понеже срѣдното живо тегло на овцетѣ е подъ 45 кгр. Отъ всичко 435 контролирани овце въ тази околия, само 44 или 10% иматъ живо тегло 45 кгр. и надъ 45 кгр.; 162 овце или 38% иматъ живо тегло отъ 35—45 кгр. Останалитѣ 226 овце или 52% иматъ живо тегло отъ 29—35 кгр. Съвсемъ друга картина се добива, ако разпредѣлимъ сжщитѣ овце по тѣхната млѣчна производителность и вълнодайность. Отъ всичкитѣ овце 389 или 90% иматъ млѣчность надъ 80 литри, 289 или 67% надъ 100 литри и само 43 овце или 10% подъ 80 литри. По отношение срѣдното количество настригана вълна—руно и подстригъ, повече отъ овцетѣ сжщо така отговарятъ на предвиденитѣ въ правилника норми. Надъ 2 кгр. вълна сж дали 405 овце или 94%, надъ 2.5 кгр. — 236 овце — 55%, а подъ 2 кгр. вълна сж дали само 27 овце — 6%.

Знае се, че отъ тритѣ стопански качества на овцетѣ, които сж обектъ на контролата: млѣчна производителность, вълнодайность и живо тегло, по своята полезность последното стои на трето мѣсто. Освенъ това, живото тегло се влияе, въ сравнение съ другитѣ две производителни качества: млѣчность и вълнодайность, много повече отъ външнитѣ ненаследствени фактори: хранене и гледане и винаги може за късо време и по-добро хранене, чувствително да се увеличи. При избилна паша и добро хранене овцетѣ бързо качватъ живото си тегло и обратно — при лошо хранене и оскждна паша, живото тегло чувствително пада. Съвсемъ другояче стои въпроса съ количеството и качеството на вълната и млѣчната производителность на овцетѣ. Тѣзи две стопански качества сж свързани повече съ генотипа на овцетѣ и въ по-малка степенъ се влияятъ отъ външнитѣ не наследствени фактори. Както се отбелязавече, отъ 313 овцевъдни стопанства участвували въ конкурсната контрола, едвамъ 123 или 39.3%, сж признати за „развъдни“. Отъ останалитѣ 190 стопанства