

ВАТЪ. В. п. а̀кò ѿкаме да смѣнимъ 50
ѿкн вѣно ѿ втòрыа примѣръ, нарёждаме
цѣны́те каквòто показова слѣдѹщѣй
примѣръ .

1,0 : 5,0 :: 2 : χ = 10 тòлко ѿкн ѿ 1-й вѣдъ.

$$\frac{2}{10}$$

10 : 50 :: 2 : χ = 10 тòлко ѿ втòрыа .

1,0 : 5,0 :: 6 : χ = 30 тòлко ѿ трѣтѣа .

$$\frac{6}{30} \dots \text{ѿкн} .$$

Говòримъ тàко: а̀кò 10-те ѿкн зѣматъ
2 ѿкн ѿ пѣрвыа вѣдъ, 50-те ѿкн кòлко
ѿкн ще зѣматъ?

Такà пы́таме ѿ за втòрыа ѿ трѣтѣа
вѣдъ ѿ нахòждаме сòсъ тàмъ лѣсннà кòл-
кòто ѿкн нѣ трѣбоватъ .

Ѿпыта на смѣшенѣето прàвнимъ та-
кòвъ: о̀умножа́ваме ѿкнѣте на смѣшенѣето
сòсъ цѣнàта дѣто ще сà прода́ва. В. п.
50 по 11 пары прàвѣтъ 550 пары, ѿ на
вѣсѣй вѣдъ ѿкнѣте катò о̀умножѣмъ сòсъ