

това, трѣбва да се признае, че всичкитѣ вещества на заразени болести се унищожаватъ отъ голѣмата горещина, въ която се пече хлѣбътъ. Исклучена е, прочее, възможността да се прѣдадатъ заразителни болести чрѣзъ направо извадения отъ пещъта хлѣбъ. Забѣлѣжка. Подобно мнѣние е прѣобладавало до сега и се подѣржало почти отъ всичкитѣ медицински автори. Обаче при направенитѣ отъ D-r Waldo и D-r Walh опити, дали опечениятъ хлѣбъ е стерилень, тѣ сж открили, слѣдъ изваждането на хлѣба отъ пещъта, тринадесеть различни микроорганизми. Сжщитѣ автори, при опити съ холерни бацили, сж могли да култивиратъ такива въ хлѣба, при заразяването брашното съ култури отъ холерни бацили. Waldo и Walh казватъ, че въ окрѣзи, гдѣто върлува холерата, чрѣзъ употребяване на заражена вода за прѣготовлението на хлѣба, болестъта може да се разпространява и чрѣзъ хлѣба. Тѣ вѣрватъ, че по този начинъ би могли да се обяснятъ нѣкои загадѣчни заразявания отъ холерата. Нѣколко седмици слѣдъ съобщаването въ British medical journal Association въ Bristol тия изслѣдвания, Surgen Major Rennie описалъ въ Britisch medical Journal двѣ тифозни епидемии въ Индия вслѣдствие на заразенъ хлѣбъ. А пѣкъ, въ послѣдно врѣме. M Roussel, Docteur en pharmacie (Militärärztliche Zeitschrift 1909 година) е произвелъ опити, дали виру-