

разяването. Единъ важенъ моментъ въ случая е, че прѣзъ заразената вода бактериитѣ се разпространяватъ и въ домакинството, че тѣ при изплакнуването на съдоветѣ попадатъ въ млѣкото и въ други съѣстни прѣдмети, а пъкъ нѣкои отъ тѣзи прѣдмети, при удобна топлина, сж за бактериитѣ отлична хранителна почва, въ която тѣ бърже се размножаватъ. Сигурно не е безразлично, дали се погълтнатъ само нѣколко въ водата суспендирани „измършавѣли“ тифозни бактерии, или пъкъ по-горѣ — оказанія начинъ, бърже размножающитѣ се бактерии.

Заразата на съѣстнитѣ прѣдмети би могла да послѣдва и по другъ начинъ. Възможността да се прѣнесе заразата чрѣзъ насекоми е експериментално доказана, напр. чрѣзъ мухитѣ, които кацватъ ту върху испражненията или кирливото пране и др., ту върху съѣстнитѣ прѣдмети. Особно френскитѣ автори съобщаватъ, че дѣйствително въ стаитѣ, въ които лежатъ болни отъ холера, случайно млѣкото ставало огнище за развъждане на холерни вибриони. Който вижда въ досаднитѣ мухи не само едно безпокойствие, но хигиенична опасностъ, той енергично ще се стреми да отстрани всичко, що би могло да благоприятствува на такава опасностъ. Ползата отъ борбата противъ мухитѣ е очевидна: подобрява се здравословното състояние на населе-