

то прави или да са притеглятъ единъ други или да са оттласкатъ, приближаватъ или отдалечаватъ земята и на други таквизъ.

876. *Кои сж главнитѣ видове на облацитѣ, по какви знакове ги познаватъ и що показватъ?* — Главнитѣ видове на облацитѣ сж: перясти (кждрести) (*сиррюс*) валмести (*кюмююс*) пластести (*стратюс*) поройни или дъждовни (*Нимбюс*).

*Перяститѣ облаци* — *сиррюс* по латински ще каже косъми, завивка — сж дребни белизнияви облачета, които иматъ изгледъ на тънки кончѣта, твърдѣ прилични на хвандакъ вълна. Тѣ сж най-издигнати отъ венчки, и като сждимъ по ниската температура на тѣзи область, въ която са срѣщатъ, трѣба да полагамъ че състоѣтъ изъ ледни частици; често тѣ сж расположены на параллелнитѣ редове, които отиватъ къмъ страни, които са намѣрватъ въ свръзка съ магнитния меридианъ. Тѣ иматъ сжщо нѣкакво отношение къмъ сѣверното грѣянье; появяванъето имъ предшества и предсказва промѣна на времето или въобще приближаванъето на добро време.

*Валместитѣ облаци* — *кюмююс* — по латински, което ще каже купъ — сж валчести, често наведени единъ къмъ други, по-обикновенни лѣтъ, отъ колкото зимѣ. Тѣ са появяватъ сутринъ а вечеръ са загубватъ; а ако останжтъ подиръ залѣзванъето на слънцето тѣ са уголѣмяватъ съ перяститѣ, които иджтъ надъ тѣхъ, тогазъ трѣба да чакамы дъждъ или бура.

*Пластеститѣ облаци*, — *стратюс*, пластъ, — представятъ хоризонтални пластове, които са образуватъ при залѣзванъето на слънцето отъ истинванъето на земята или отъ въздуха; съ изгрѣванъето на слънцето тѣ са изгубватъ. Тѣ са появяватъ по-често есенъ, а лѣтъ по-рѣдко; височинната имъ е по-малка отъ валместитѣ; а още повече отъ перяститѣ.

*Дъждовнитѣ облаци* — по латински *нимбюс*, дъждъ — не представѣтъ никаква отличителна черта, тѣ биватъ широки, тежки, много или малко пенеляви, по нѣкога даже тѣ ставатъ черни, краевитѣ имъ иматъ рѣсени. Самото имъ име показва че тѣ предсказ-