

1860. *По кой начинъ може да са произведе повръщаньето?* — 1) Като са даде на болния една голѣмка чаша пълна съ топла и малко подсладена вода; 2) или като му дадемъ да земе нѣкое силно *повръщателно*, което се прави тѣй: въ една чаша съ вода до 35 д. сипватъ една лжжица хардаль счукантъ; или пѣкъ въ чашата гуждатъ три чашки горѣща вода и толкозъ хладко масло, силно го разбиватъ и го даватъ да са пие на всѣки петъ минути, додѣто са произведе повръщаньето; 3) ако не може да са произведе силно повръщаньето, трѣба да бръкнемъ съ прѣстъ въ гърлото или да пжлнемъ та да го погждаличками съ меката брадичка на перото.

1861. *По кой начинъ може да са утиши мѣстното раздражение на оногозъ, който са е утровилъ?* — 1) Трѣба да са гудѣжтъ на търбоха кжрпи намокрени въ умекчителни сварявания; да са намокря често съ сюнгеръ потопенъ въ топла вода, или да са потопи болний въ баня съ хладка вода и да са остави тамъ нѣколко часа, като са стопля водата отъ време на време; 2) ако тѣзи успокоителни средства не помогнѣтъ, необходимо е да са турѣжтъ на търбоха 10—12 пиевици близо до туй мѣсто, дѣто болний усѣща най-голѣми болки.

1. Концентрирани кислоти.

1862. *Пребройте най-обикновеннитѣ отровни минерални кислоти?* — Хлористоводородната кислота (туз-руху); азотната (кизабъ); пригорѣло-дървената (дървенъ оцѣтъ); сѣрната (зачъ-я); сѣрнокислото жельзо или желѣзний копоросъ.

1863. *Що трѣба да са прави съ лицето, що е погжлижло нѣкоя минерална кислота?* — 1) Трѣба да му са даде да пие млѣко или чашка съ вода, въ която има растопенъ нѣкой попивателенъ алкали, напр. горена магнезия или ако нѣма на ржки, тогазъ тибширь, гипсъ (алчия) или, най-послѣ, сапунъ, който стопяватъ въ топлата вода, додѣ смѣсъта земе видъ на каймакъ; 2) подирь 5 минути даватъ му дру-