

ковистокисела окисъ на мѣдъ; — естественната зеленина или основната вѣглекисела окисъ на мѣдъ; некуственната — или основно оцѣтно-кисела окисъ на мѣдъ; синий купурoсъ или сѣрнокисела окисъ на мѣдъ.

1876. *Кога е за страхуване отравянето отъ мѣдъ?* — Когато варимъ кисели или мазни ястѣя въ недобрѣ очистенъ или неганосанъ мѣденъ сѣждъ, и ги оставимъ да истинѣтъ въ него. — Виното, оцѣтътъ, маслото, млѣкото и въобще всички мазни, що са намѣрватъ въ мѣдний сѣждъ, спомагатъ за образуванъето на мѣдната зеленина и ставатъ твърдѣ отровни.

Мѣднитѣ тенджери не показватъ никакво вредително дѣйствиe върху мазното ястѣе, ако само го не оставятъ да истине въ тенжеритѣ, които при туй, трѣбва да бѣждѣтъ съвършенно чисти; за туй всекога е опасно да варимъ кисели ястѣя.

1877. *Кой цѣръ са употребява противъ отравянето отъ мѣдни соли?* — 1) Потребно е да са испие нѣколко чаши студена вода съ захаръ, додѣ са пригответи топла или 2) да са гудѣтъ 6 яйчени бѣлтѣци въ  $\frac{1}{2}$  литра вода и безъ да са растриватъ, по скоро да са испиѣтъ; въ случай ако нѣма на рѣки яйца, потребно е да са земе брашно или пресѣчено млѣко. — Туй сѣщото противоядие можѣ да са употреби противъ отравянето отъ цинкъ и живакъ, и-менно отъ цинковъ купурoсъ (сѣрнокисела окисъ отъ цинкъ) и каломель (хлористъ живакъ) отровителенъ въ голѣмъ обѣемъ и сюлюймень (двухлористъ живакъ) отровителенъ, макаръ и най-малко да са земе.

## 5. Свинецъ.

1878. *Въ какви главни видове е отровенъ свинеца?* Во видѣ на бѣлило, свинцова захаръ и гумердова вода и др.

Свинцовото бѣлило е вѣглекисела окисъ отъ свинецъ. — Сурикъ (минимумъ, сюлюентъ) е съставъ изъ окисъ на свинецъ съ преокисъ. — Свинцова захаръ е оцѣтнокисела окисъ отъ свинецъ; а растопяванъе-