

стелка; 3) да са гуди въ баня съ вода при обикновена температура на кладенецъ, и на всеки двѣ минути трѣба да излива въ нея по-малко вода тъй що въ продължение на три четвърти отъ часа температурата да би достигнѣла 25° и 36° ц. и пулсътъ би захванѣлъ да са съживява; 4) нѣколко пѣти въ банята да триѣтъ лицето съ суха кърпа, а подиръ го прѣскалъ съ студена вода; 5) да са мѣчатъ за да докарать първото вдѣхванье, като гуждатъ подъ носа му стъкленице съ лѣтлива соль или като гѣделичката поздритъ съ опашката на перо или като вдѣхваторъ въ тѣхъ въздухъ посредствомъ масурчета. — Ако не могатъ приготви баня, трѣбва да са растрива тѣлото съ кърпа намокрена най-напредъ въ кладенчова вода, а по-подиръ въ топла. Най-доброто средство за съживяванье на замръзнѣлитъ стави — е да са триѣтъ съ снѣгъ, додѣ са покаже дѣйствиe. Нѣкой пѣтъ замръзнѣлъ са съживѣвали 12 или 15 часове подиръ привидната смъртъ.

15. Асфиксия отъ топлина.

1892. *Какъвъ цѣръ да са подаде на тогось, който е задушенъ отъ горѣщитъ зари на слънцето, отъ нѣкой силенъ огнь или отъ много бѣзрже бѣганье?* — 1) Трѣбва по-скоро да принесѣтъ болния въ прохладно, но не и въ студено мѣсто; 2) да му са налѣе въ устата вода, окиселена съ малко оцѣтъ и съ лимоненъ сокъ, и да му са даде сѣщи промивателни (глистири), само съ малко оцѣтъ. — Полезни сѣ сѣщо бани на краката отъ умѣренна топла вода. Ако ли болниятъ не уеѣти олекванье отъ туй лѣкуванье, трѣба да са гудѣтъ пиевици на задний прѣходъ, или да му са пусне кръвъ.

16. Асфиксия отъ вжглена кислота,

1893. *Какви помощи сѣ даватъ на задушения отъ газа, вжглена кислота, който са испуща кога кипи виното и бирата, кога горятъ вжглища, еще въ руд-*