

говатыхъ, искривленныхъ, витыхъ, скрученныхъ кусковъ, различной величины и цвѣта.

4. *Traganthon*, *трагантонъ*, нисшій сортъ трагаканта, имѣющій видъ неправильныхъ, слившихся въ одну массу, кусковъ различной величины и буроватаго цвѣта. Слизь, приготовленная изъ трагантона, менѣе густа и вязка, нежели слизь изъ другихъ сортовъ. Трагантонъ впрочемъ обозначаетъ всякій болѣе или менѣе низкій сортъ трагаканта.

С. ч. Трагакантъ, главнымъ образомъ, состоитъ изъ *бассорина*, вещества, *разбухающаго въ водѣ, но не растворимаго въ ней*. Кроме того находится небольшое количество растворимой камеди, крахмала и, въ морейскомъ трагакантѣ, крахмального сахара. Изъ 100 ч. трагаканта получается 3,16% золы, состоящей, главнымъ образомъ, изъ углекислой извести (*Guérin-Varry, Bucholz, Hausmann*).

У. Свѣжеприготовленная слизь трагакантной камеди, *Mucilago Tragacanthae*, изъ 1 ч. мелкаго порошка трагаканта и 48 ч. кипящей воды, служитъ для приготовления лепешекъ (*Pastilli et Trochisci*).

Нисшіе сорты трагаканта употребляются въ технику.

Трагакантъ былъ извѣстенъ древнимъ народамъ. *Теофрастъ* говоритъ о трагакантѣ, происходящемъ изъ Крита, Пелопонеза и сѣверной Персіи. Греческіе и римскіе врачи употребляли трагакантъ внутрь и снаружи. Въ Европѣ трагакантъ извѣстенъ съ XII столѣтія; онъ назывался *Draganti*. Название: *Tragacantha*, ἡ τραγακάνθα, происходитъ отъ ὁ τράγος — *козелъ* и ἡ ἀκάνθος — *шлистое растеніе*, потому что козы охотно ѣдятъ его.

---

*Gummi Acajou*, *камедь-акажу*, *Acajou-Gummi*, выдѣляется изъ ствола *вестъ-индійскаго анакарда*, *Anacardium occidentale* L. (плоды котораго описаны въ Т. I, на стр. 478). Камедь-акажу представляется въ видѣ неправильныхъ, желтоватыхъ, снаружи поло-сатыхъ, шероховатыхъ, внутри съ трещинами, просвѣчивающихъ кусковъ различной величины. Содержитъ акацинъ и бассоринъ.