

А. КАМЕДИСТЫЯ СМОЛЫ, НЕ СОДЕРЖАЩІЯ ЭЭИРНАГО
МАСЛА.

GUMMI-RESINA EUPHORBIUM.

Euphorbium, Gummi Euphorbiæ.

Евфорбій, молочайная камедь, сокъ молочая.

Euphorbium. Euphorbe. Cypress spurge.

1. EUPHORBIA CANARIENSIS L. 2. EUPHORBIA RESINIFERA Berg.

SYST. NATURALE: Euphorbiaceæ.

SYST. SEXUALE: Monoecia Monandria.

Euphorbia Canariensis — кустарничное, мясистое, безлистное растеніе, похожее на кактусъ, съ 4-хъ-сторонними, у основанія деревянистыми, длинными и толстыми вѣтвями, по краямъ которыхъ находятся, въ короткихъ и равномѣрныхъ разстояніяхъ, многочисленные возвышенные бугорки, а на нихъ развивается, на каждомъ бугоркѣ, по одной парѣ короткихъ шиповъ (*stipulae spinescentes*). Между двумя бугорками, на самомъ верху вѣтвей, находится по одному небольшому углубленію, изъ котораго развивается почти сидячее цвѣторасположеніе, а изъ углубленій на нижней части стволовъ развиваются вѣтви. *Euphorbia Canariensis* растетъ на горахъ Канарскихъ острововъ (группа острововъ въ Атлантическомъ океанѣ, въ 18 миль отъ западнаго берега Африки, принадл. Испаніи). *Euphorbia resinifera* различается отъ предыдущаго вида тѣмъ, что вѣтви его втрое тонче и что цвѣтки расположены на довольно длинныхъ ножкахъ; кроме того бугорки на вѣтвяхъ *Euphorbiae resiniferae* почти плоски.

Евфорбій получается также отъ *Euphorbia antiquorum* L., растущаго въ Остъ-Индіи, Аравіи и Египтѣ, и отъ *Euphorbia officinarum* L., растущаго на песчаной почвѣ во многихъ странахъ Африки, преимущественно въ Эоіопії.

Въ корѣ и периферической части сердцевины вѣтвей означеныхъ видовъ *Euphorbiae* заключаются многочисленные вѣтвистые и толстостѣйные млечные сосуды, изъ которыхъ, отъ ма-