

лѣйшихъ надрѣзовъ, вытекаетъ обильное количество густаго, бѣлаго, остраго сока, засыхающаго на воздухѣ, образуя хрупкую массу и покрывая преимущественно шипы вѣтвей. По наблюденіямъ *Jackson*-а жители нижняго горнаго хребта Атласа собираютъ засохшій млечный сокъ съ большою осторожностію, завязывая ротъ и носъ платкомъ, чтобъ пыль евфорбія не попала въ дыхательные органы. Одно и то же растеніе даетъ обильное количество млечнаго сока, но только чрезъ 4 года (*Jackson*). Евфорбій вывозится изъ Сале (городъ въ Марокко, при устьѣ Бурегреба) и Могадора (приморскій городъ въ Марокко, на берегу Атлантическаго океана), въ Англію.

Евфорбій представляется въ видѣ разнообразныхъ кусковъ, величиною отъ чечевичнаго сѣмени до горошины; многіе куски *округленно-треугольны*, что указываетъ на мѣсто засыханія млечнаго сока, т. е. вытекшаго около шиповъ и покрывшаго ихъ. Многіе куски, наконецъ, цилиндрическіе, внутри полые, съ одною или нѣсколькими дырочками. Куски евфорбія просвѣчиваютъ или непрозрачны, хрупки, желтоваты или буроваты; поверхность покрыта пылью. Къ евфорбію всегда примѣшаны маленькіе камышки, кусочки ствола (съ двумя шипами, длиною около 2-хъ линій и такого же разстоянія другъ отъ друга), кусочки цвѣтка и коробочки растенія.

Евфорбій безъ запаха; но пыль его возбуждаетъ сильнѣйшее чиханіе, воспаленіе дыхательныхъ органовъ и пузыри. При нагрѣваніи евфорбій распространяетъ довольно пріятный запахъ, напоминающій запахъ ладона; при болѣе сильномъ разгоряченіи плавится, воспламеняется и сгораетъ яркимъ пламенемъ. Вкусъ евфорбія жгучій, очень острый и долго отзывающійся во рту. Въ водѣ растворяется небольшое количество камеди; отъ прибавленія крѣпкаго спирта она вновь выдѣляется изъ раствора. При растираніи молочая съ водою не получается эмульсии. Безводный спиртъ растворяетъ отъ 40 до 60% смолы, имѣющей желто-бурый цвѣтъ.

С. ч. Смола (отъ 40 до 60%), воскъ (14 — 19%), каучукъ, яблочнокислыя соли извести и кали (13—22%), небольшое коли-