

чество сѣрнокислой и фосфорнокислой извести (*Brandes, Braconnot* и *Pelletier*).

Смола евфорбія имѣетъ слабо-кислую реакцію; спиртный растворъ ея мутится отъ щелочей; она состоитъ изъ смѣси нѣсколькихъ смоль. Отъ смолы зависитъ острое, красноту-наводящее дѣйствіе евфорбія.

Въ водной вытяжкѣ евфорбія нѣтъ сахара. 100 чч. отборныхъ кусковъ евфорбія даютъ 9,2% золы, содержащей соли кали и извести.

У. Евфорбіи употребляется почти только *снаружи*, какъ красноту-наводящее и нарывное средство; онъ входитъ въ составъ *Emplastri Euphorbii*, *Emplastri Cantharidum perpetui*, *Unguenti Euphorbii* и нѣкоторыхъ другихъ наружныхъ формъ.

Евфорбіи былъ извѣстенъ древнимъ. *Диоскоридъ* описалъ добываніе евфорбія, а *Плиній* сообщаетъ, что это средство открыто во время царствованія короля *Юба* (царь нумидійскій, сынъ Гіемпсала II, ум. въ 46 г. до Р. X.). Названіе растенія: το εὐφόρβιον *Euphorbia*, дано въ честь лейбъ-медика сказаннаго короля *Евфорбія* (*Plinius XXV 39*).

GUMMI-RESINA GUTTI.

Gutti. Cambogia. Gambogium. Gutta gamba. Chrysopum. Succus Garciniae Cambogiae.

Гуммигутъ.

Gummigutt. Gomme-gutte. Gamboge.

GARCINIA MORELLA Desrousseaux. (**GARCINIA ELLIPTICA** Wallich.
G. GUTTA Wight. **HEBRADENDRON GAMBOGIOIDES** Graham.)

SYST. NATURALE: Guttiferae.

SYST. SEXUALE: Polyandria Monogynia.

Garcinia Morella — дерево, вышиною до 50-ти футовъ, растетъ въ Сіамѣ (Сіамъ или Таи, королевство въ Индо-Китаѣ) и