

ствуетъ еще нѣсколько сортовъ его, не встрѣчающихся въ европейской торговлѣ, а именно:

Гуммиутъ изъ Цейлона, *Cambogia Zeylanica*, получается отъ дерева *Hebradendron gambogioides* Graham, образующаго, на Цейлонѣ, цѣльные лѣса. Гуммиутъ изъ Цейлона представляется въ видѣ плоско-выпуклыхъ массъ, вѣсомъ въ фунтъ и болѣе, или неправильныхъ кусковъ, состоящихъ изъ слипшихся между собою зерень (слезъ). Внутри этой массы находится множество полостей, наполненныхъ землистымъ порошкомъ. Но самыя зерна или слезы имѣютъ видъ, цвѣтъ, блескъ и изломъ лучшаго сіамскаго трубчатаго гуммиугута; эмульсія цейлонскаго гуммиугута также однобразная какъ и эмульсія сіамскаго (*Christison*). Цейлонскій гуммиутъ продается на базарахъ на Коромандельскомъ берегу (*Ainslie*).

Мизорскій гуммиутъ, *Cambogia Misorensis*, вѣроятно получается отъ дерева *Garcinia pictoria* Roxburgh, образующаго цѣльные лѣса въ западной части Мизора (или Мейсоръ, Mysore, въ южной части Индустана). Мизорскій гуммиутъ похожъ на сіамскій, хотя красящее вещество изъ первого менѣе прочно красящаго вещества послѣдняго (*Roxburgh* и *Cleghorn*).

Гуммиутъ изъ Борнео получается отъ неизвѣстнаго дерева, растущаго на Борнео (величайш. островъ въ Индѣйскомъ архипелагѣ) и вывозится въ Сингапуръ, где Китайцы его очищаютъ для продажи. Этотъ гуммиутъ похожъ на цейлонскій.

Отъ дерева *Garcinia Cambogia Desrousseaux* (*Mangostana Cambogia Gaertner*), растущаго на Малабарскомъ берегу и въ Траванкорѣ (государство въ юго-западной части Индустана), получается мягкая, желтая смолистая масса, не дающая эмульсіи. Этотъ гуммиутъ совершенно различенъ отъ сіамскаго, содержить 66% смолы, 14% арабина, 12% эоирнаго масла и 5% древесины (*Christison*). Равнымъ образомъ, отъ дерева *Xanthochymus pictorius* Roxburgh (*Stalagmites pictorius* Don) получается сѣро-зеленая, плотная смолистая масса, содержащая 76,5% смолы и 17,6% арабина. Эоирнаго масла въ ней нѣть (*Christison*).