

провинції Иракъ-Аджеми, близъ Езда (область и городъ) и сперва описано англичаниномъ *Don*, въ 1829 г. Потомъ оно найдено также *Lehmann*-омъ, въ 1840 г. и, главнымъ образомъ, русскимъ ученымъ *И. Борщовымъ*, въ 1857 и 1858 г., въ песчаныхъ степяхъ, на востокѣ отъ Аральского моря и у береговъ Сыръ-Дарья. Потомъ дерптскіе профессора *Bunge* и *Bienert*, въ 1859 г., занимались этимъ предметомъ. Въ превосходномъ сочиненіи *И. Г. Борщова*: *Die pharmaceutisch-wichtigen Ferulaceen der aralo-caspischen Wüste, nebst allgemeinen Untersuchungen über die Abstammung der im Handel vorkommenden Gummiharze: Asafoetida, Ammoniacum und Galbanum, von El. Borsczow*, mit 8 Tafeln, St.-Petersburg, 1860, — находится весьма подробное описание означенныхъ растеній съ прекрасными рисунками.

Название: *Dorema* заимствовано отъ тѣ дёру — копѣ или пика, по прямовсходящему стеблю растенія. Слово: *Ammoniacum* дано *Діоскоридомъ* по нахожденію растенія близъ храма *Юпитера Амона* (*Gummi, quod ad Ammonis Oraculum gignitur*), или же отъ ἡ αμμός — песокъ, по песчаной почвѣ, на которой исключительно растетъ *Dorema*.

GUMMI-RESINA ASA FOETIDA.

Asa s. Assa foetida. Laser foetidum. Scorodolasarum, Stercus Diaboli.

Асафетида. Вонючая смола. Аса.

Asant, Stinkasand, Teufelsdreck. Ase fétide. Asafoetida.

SCORODOSMA FOETIDUM Bunge. (FERÜLA ASA FOETIDA L.
ASAFOETIDA DISGUNENSIS Kaempfer.)

SYST. NATURALE: Umbelliferae-Peucedaneae.

SYST. SEXUALE: Pentandria Digynia.

Scorodosma foetidum — многолѣтнее растеніе — растетъ въ песчаныхъ степяхъ между Персидскимъ заливомъ и Аральскимъ озеромъ. Это зонтичное растеніе обыкновенно растетъ группами на огромныхъ пространствахъ, образуя лѣсочки. Въ юго-запад-