

тичное растеніе снабжено стеблемъ вышиною до 7-ми футовъ и толстымъ, длиннымъ, вѣтвистымъ, снаружи бурымъ, внутри бѣлымъ корнемъ. На верхней части этого корня, а также и на нижней части стебля, дѣлають надрѣзы, изъ которыхъ вытекаетъ золотисто-желтый млечный сокъ, засыхающій на воздухѣ и дающій опопанаксъ.

Въ торговлѣ различають два сорта опопанакса: *зернистый* и *въ массахъ*.

1. *Зернистый опопанаксъ*, *Oporanax in granis*, *Oporanax in Körnern*, представляется въ видѣ неправильныхъ, большею частью округленныхъ кусковъ, величиною отъ горошины до грецкаго орѣха; они хрупки, удобо-растираемы, снаружи красно-желты, матовы, непрозрачны, на ощупь жирны, въ изломѣ съ бѣдными и темными пятнами и со слабымъ восковымъ блескомъ. Уд. вѣсъ опопанакса 1,622. Запахъ сильный, непріятный, нѣсколько похожій на запахъ корня зори и аммоніачной камедистой смолы; вкусъ бальзамическій, горькій. Порошокъ опопанакса желтый. Съ водою даетъ желтую эмульсію. Спиртъ растворяетъ часть опопанакса буро-желтымъ цвѣтомъ. При разгоряченіи не вполнѣ плавится, выдѣляя непріятный, чесночный запахъ, бурѣетъ, воспламеняется, сгораетъ яркимъ пламенемъ и оставляетъ обильное количество трудно сгораемаго угля.

2. *Опопанаксъ въ массахъ*, *Oporanax in massis s. in placentis*, *Oporanax in Massen*, образуетъ неправильныя, сѣро-бурья, или желтовато-красныя, хрупкія массы, заключающія обильное количество постороннихъ веществъ. Изломъ кусковъ слабо-блестящій. Вкусъ опопанакса въ массахъ менѣе горькій вкуса зернистаго опопанакса.

С. ч. *Эфирное масло* (около 3⁰/₁₀), *смола* (42⁰/₁₀), *камедь* (33,4⁰/₁₀), *крахмалъ*, *воскъ* и *яблочная кислота* (*Pelletier*).

Опопанаксъ принадлежитъ къ забытымъ врачевнымъ средствамъ, хотя оно въ древности имѣло очень обширное примѣненіе, на что указываетъ и самое названіе: ὁ ὀποπάναξ, ἀκος, отъ ὀπος—*млечный сокъ* и παναχῆς, ἐς—(παν, *все* и ἀκίερα, *лечить*) *излечивающее все*, т. е. *универсальное средство*.