

У. *Resina Lacca in granis* весьма рѣдко употребляется для приготовления полосканія рта, *Tinctura Laccae aquosa* (Laccae in granis 3j, Aluminis 5jj, Aquae Rosarum 3v, digere et filtra), имѣющей красный цвѣтъ и вяжущій вкусъ.

Шеллакъ имѣеть обширное употребленіе въ технику, для сургуча, различныхъ лаковъ, столярной политуры, замазокъ и др. предметовъ. Изъ бѣленаго шеллака готовится безцвѣтный лакъ.

Lacca in ramulis служитъ для приготовления двухъ красокъ, называемыхъ *Lack-Lack* и *Lac-Dye* (*Лакъ-дей*) и употребляемыхъ для окрашиванія сукна въ красный цвѣтъ. Для получения *Lack-Lack* измельчиваютъ гуммилакъ въ палочкахъ, порошокъ обливаютъ водою, настаиваютъ, жидкость процеживаютъ, прибавляютъ растворъ квасцовъ, вслѣдствіе чего краска осаждается и потомъ высушивается. *Lack-Lack* имѣеть видъ квадратныхъ кусковъ, сине-чернаго цвѣта; порошокъ его темно-красный; содержитъ половину по вѣсу красящаго вещества, $\frac{1}{3}$ ч. смолы и $\frac{1}{6}$ ч. глинозема. Изъ *Lack-Lack* готовится *Lac-Dye* очищеніемъ перваго. *Lac-Dye* имѣеть свѣтло-красный цвѣтъ и содержитъ гораздо меньше смолы.

RESĪNA LADĀNUM.

Ladanum, Labdanum, Gummi-Ladan.

Лабданъ. Ладанъ.

Ladanharz. Ladanum.

1. **CISTUS CRETICUS** L. (**CISTUS TAURICUS** Presl.)
2. **CISTUS CYPRIUS** Lamarck.
3. **CISTUS LADANIFERUS** L.

SYST. NATURALE: Cistineae.

SYST. SEXUALE: Polyandria Monogynia.

Означенные виды *Cisti* (и еще другіе) растутъ въ Малой Азии и Южной Европѣ, преимущественно на островахъ Кипрѣ и Кандіи. Изъ молодыхъ вѣтвей и листьевъ кустарниковъ, преиму-