

RESĪNA SANDARĀCA.

Sandarāca s. *Sandaracha*. *Vernix sicca*.

Сандаракъ.

Sandarak. Sandaraque. Gum Juniper.

CALLĪTRIS QUADRIVĀLVIS Ventenat. (THUJA ARTICULATA Vahl.)

SYST. NATURALE: Coniferae-Cupressinae.

SYST. SEXUALE: Monoecia Monadelphia.

Callitris quadrivalvis — деревцо, вышиною до 20-ти футовъ, растеть въ Алжиріи, на Атласѣ и на другихъ горахъ сѣверо-западной Африки. Изъ трещинъ или надрѣзовъ коры ствола вытекаетъ смола, которая скоро засыхаетъ на воздухѣ. Сандаракъ вывозится изъ Могадора (приморскій городъ Марокской имперіи, на бер. Атлантическаго океана).

Въ торговлѣ различаютъ два сорта сандарака: *отборный* и *обыкновенный*.

1. *Отборный сандаракъ*, *Sandaraca electa*, представляется въ видѣ продолговатыхъ, желтоватыхъ, просвѣчивающихъ, хрупкихъ зеренъ, длиною отъ 2-хъ до 8-ми, толщиною отъ 1 до 3-хъ линій, снаружи покрытыхъ порошкомъ, въ изломѣ блестящихъ и раковистыхъ. Запахъ довольно пріятный, особенно при нагрѣваніи, нѣсколько похожій на запахъ можжевельника; вкусъ смолистый, едва горьковатый. При жеваніи сандаракъ *хруститъ, не слипаясь въ массу*. Уд. вѣсъ смолы 1,050. Спиртъ растворяетъ всю смолу, а терпентинное масло и бензолъ — часть ея. При разгоряченіи выше 100° сандаракъ размягчается, при 135° плавится, разбухая.

2. *Обыкновенный сандаракъ*, *Sandaraca in sortis* s. *naturalis*, состоитъ изъ смѣси желтоватыхъ, буроватыхъ и непрозрачныхъ зеренъ.

С. ч. Сандаракъ состоитъ изъ *трехъ* смоль, имѣющихъ кислоты свойства (*Unverdorben, Johnston*).

У. Сандаракъ входитъ въ составъ нѣкоторыхъ наружныхъ средствъ.