

В. BALSĀMA, БАЛЪЗАМЫ.

BALSĀMUM COPAÏVAE.

Balsamum Copaibae s. *de Copahu* s. *brasiliense*.

Копайскій бальзамъ.

Корайвобальсам. Baume de Copahu. Copaiva.

1. COPAIFĒRA MULTIJŪGA Hayne.
2. COPAIFĒRA LANGSDORFII Desfontaines.
3. COPAIFĒRA CORIACEĀ Martius.
4. COPAIFĒRA JACQUINI Desfontaines. (C. OFFICINALIS L.)

SYST. NATURALE: Caesalpiniaceae.

SYST. SEXUALE: Decandria Monogynia.

Вышеозначенные виды *Copaiferae* (и еще около 16 видовъ) растутъ въ Бразиліи, Парагвай, Боливіи, Костарика и Вестъ-Индіи. *Copaifera multijuga* находится въ сѣверо-западной части Бразиліи, именно въ Альто-Амазонасъ (или просто Амазонасъ, провинц. Бразиліи, орошается рѣкою Амазонскою; главный гор. Барра) и Парá (самая сѣверная и величайшая изъ провинцій Бразиліи). *Copaifera Langsdorffii* растеть въ провинціяхъ Санъ-Пауло и Минасъ-Гераесъ (въ Бразиліи). *Copaifera coriacea* растеть въ тѣхъ же странахъ, а *Copaifera Jacquini* — въ сѣверныхъ странахъ Южной Америки, преимущественно въ республикѣ Венесуэлѣ, а также и въ Вестъ-Индіи, на Тринидадѣ (англійск. остр., самый важный изъ малыхъ Антильскихъ острововъ).

Деревья, дающія копайскій бальзамъ, большія, прямовосходящія, съ весьма вѣтвистою верхушкою, твердою корою и скважистою, свѣтло-бурою древесиною. Листья кожистые, небольшіе, съ 8—10-парными листочками, расположенными на темно-буромъ, смолистомъ, блестящемъ, общемъ черешкѣ. Цвѣтки расположены въ видѣ метелки (panicula), съ красивыми бѣлыми вѣнчиками.

Копайскій бальзамъ вытекаетъ изъ надрѣзовъ и отверстій, пробуравленныхъ на стволахъ вышеозначенныхъ деревьевъ. Эти отверстія сдѣланы до самой древесины ствола, гдѣ главнымъ образомъ находятся бальзамическіе ходы. Изъ одного ствола большого