

Эфирное масло гурьюнъ-бальзама сходно съ эфирнымъ масломъ копейскаго бальзама. Формула масла: $C_{20}H_{32}$ (Werner).

Смола гурьюнъ-бальзама, гурьюновая кислота, *Curjunsäure*, $C_{44}H_{34}O_8$, образуетъ непрозрачную, безцвѣтную, крошащуюся массу, растворимую въ алкогольѣ и эфирѣ; она плавится при 220° , кипитъ и перегоняется при 260° . При охлажденіи застываетъ въ аморфную массу (Werner, 1863).

Гурьюнъ-бальзамъ во всей Индіи употребляется для лака. Его сперва описали *Lowe*, *Hanbury* и *Guibourt*.

BALSĀMUM PERUVIĀNUM NIGRUM.

Balsamum Sansonatense (самое правильное названіе). *Balsamum Indicum nigrum*. *Balsamum de Peru*.

Перуанскій бальзамъ. Сансонатскій бальзамъ.

Perubalsam. Baume de Pérou. Balsam of Peru.

MYROXYLON SONSONATENSE Klotzsch. (**MYROSPERMUM SONSONATENSE** Pereira. **MYROSPERMUM PEREIRAE** Royle.)

SYST. NATURALE: Leguminosae-Papilionaceae.

SYST. SEXUALE: Decandria Monogynia.

Myroxylon Sonsonatense растетъ въ центральной Америкѣ, въ Санъ-Сальвадорѣ, на такъ называемомъ бальзамномъ берегу, между портами Акайутла (Acajutla) и Либертадъ (Санъ-Сальвадоръ, одинъ изъ штатовъ центр. Америки у Тихаго океана, дѣлится на 4 провинц.: Санъ-Мигуель, Санъ-Винценте, Санъ-Сальвадоръ и Санъ-Сонато).

Myroxylon Sonsonatense — дерево въ 40 — 50 футовъ вышины, съ толстымъ, вѣтвистымъ стволомъ. Кора дерева неровная, пропитанная бальзамомъ. Листья непарно-перистые. Цвѣтки расположены въ видѣ кистей; вѣнички бѣлые, благовонные. Бобовица (legumina) всячія, съ плоскими, кожистыми, крылатыми краями, одно-сѣмянныя, не раскрывающіяся, внутри съ двумя бальзамическими сумками, содержащими желтоватый бальзамъ,