

## BALSĀMUM STYRĀCIS.

*Styrax* s. *Storax liquidus* s. *liquida*.

### Жидкій стиракъ.

Flüssiger Storax. Styrax liquide. Liquid Storax.

LIQUIDĀMBAR ORIENTALE Miller. (LIQUIDAMBAR IMBĒRBE

Aiton. PLATĀNUS ORIENTALIS Poccocke.)

SYST. NATURALE: Balsamifluae.

SYST. SEXUALE: Monoecia Polyandria.

*Liquidambar orientale* — дерево въ 20, 30 и 40 футовъ вышины, похожее на яворъ (*Platanus*), растеть въ юго-западной части Малой Азіи и сѣверной Сиріи. Оно образуетъ густые лѣса на прибрежныхъ мѣстахъ морскаго залива Косъ (или Ко, Станхо — Истанкой, турецк. островъ въ Эгейскомъ морѣ), преимущественно вблизи Будруна (Будрунь или Бодрунь, портовый гор. въ турецк. эялетѣ Айдинѣ въ Малой Азіи, вблизи развалины древняго города Галикарнаса); затѣмъ при Меласѣ (Меласса, Мелись, древній городъ Милазо въ Каріи), а также при устьѣ Ази (или Оронть древнихъ, рѣка въ Сиріи, впадающая ниже Антиохіи въ Средиземное море).

Жидкій стиракъ заключается въ корѣ болѣе старыхъ деревьевъ, какъ въ многочисленныхъ, толстостѣнныхъ лубяныхъ трубкахъ, такъ и въ паренхимѣ внутренняго корковаго слоя и въ сердцевинныхъ лучахъ. Въ вѣтвяхъ и стволахъ молодыхъ деревьевъ находятся разъединенныя бальзамическія или смолистыя клѣточки въ среднемъ корковомъ слоѣ. По *Unger*-у, стиракъ образуется вслѣдствіе обратнаго метаморфоза различныхъ клѣточекъ, и не въ особенныхъ органахъ.

Жидкій стиракъ собирается въ Малой Азіи особымъ племенемъ кочующихъ Туркомановъ. (Туркоманы или трухмены — неопредѣленное названіе далеко распространенной вѣтви турецко-татарскаго племени. Касаясь Сиріи и Малой Азіи, имѣютъ главн. мѣстопробываніе въ Туранской равнинѣ, въ обширныхъ степяхъ и пустыняхъ между Каспійскимъ и Аральскимъ моремъ). Въ іюнѣ и іюлѣ мѣсяцахъ они снимаютъ *наружный* слой коры де-