

CAMPHORA CHINENSIS s. JAPONICA.

Camfora. Caphura. Camfor. Casur.

Китайская или японская камфора.

Campher, Laurineencampher, Japanischer oder Chinesischer Campher. Camphre. Camphor.

CAMPHORA OFFICINARUM C. G. Nees. (**LAURUS CAMPHORA** L.
CINNAMOMUM CAMPHORA Fr. Nees. **PERSĒA CAMPHORA**
Sprengel.)

SYST. NATURALE: Laurineae.

SYST. SEXUALE: Enneandria Monogynia.

Camphora officinarum растетъ въ Китаѣ, Японіи и Кохинхинѣ. Это дерево очень распространено отъ юго-восточныхъ провинцій Китая: Кунгъ-Тунгъ и Фокіенъ (*Фокіенъ* или *Фу-кіанъ*, пров. въ Китаѣ, прибрежная съ Корейскимъ моремъ), до съверной части Амура, а также и въ Японіи. Всего болѣе оно растетъ между городами Амой и Шанхай (*Амой*, приморск. городъ въ Китайск. пров. *Фокіенъ*. *Шанхай*, важн. торгов. мѣсто и гавань въ китайск. пров. *Кіангъ-су*). Напротивъ города Амой находится островъ Формоза (по китайск. *Тай-Ванъ*), гдѣ горы покрыты цѣльными лѣсами камфорныхъ деревьевъ. Амой — главный рынокъ для торговли камфорой.

Камфорное дерево нѣсколько похоже на липовое (*Tilia*). Древесина ствола рыхла, бѣла, съ красно-бурыми жилками. Кора молодыхъ вѣтвей дерева снабжена кругомъ лубяныхъ пучковъ, содержащихъ большія клѣточки камфоры. Сердцевина состоить изъ пористыхъ клѣточекъ паренхимы. Въ древесинѣ и сердцевинѣ дерева находятся разсѣянныя клѣточки, наполненные камфорой. Листья на длинныхъ черешкахъ, эллиптические или округленно-яйцеобразные, заостренные, голые, съ тонкими просвѣчивающими точками, сѣтчато-жилистые. Цвѣтки мелкіе, зеленовато-желтые, длиною въ линію; они расположены метелками (*panicula*). Камфорное дерево хорошо растетъ во всѣхъ теплыхъ странахъ и даже въ Италии, близъ Генуя.

Всѣ части камфорного дерева содержать эфирное масло, со-