

Содержимая въ мѣшкѣ бобровая струя представляется въ видѣ желтовато-буровой, тусклой или едва блестящей массы, которая, смотря по времени сохраненія ея, мягка и вязка или плотна, смолиста и легко крошится. При тщательномъ разсмотриваніи разрѣзанного мѣшка, можно ясно различать отдѣльныя перепонки и, между ними, особенно въ сухихъ мѣшкахъ, *крошащуюся* массу, часто имѣющую узенькія трещинки.

Запахъ бобровой струи проницательный, непріятный (для некоторыхъ онъ пріятенъ). Вкусъ раздражающій, горьковатый, долго отзывающійся.

Вода растворяетъ незначительную часть бобровой струи, слегка окрашиваясь въ буроватый цвѣтъ. Крѣпкій спиртъ растворяетъ большую часть бобровой струи, оставляя перепонки и вышеупомянутыя соли. Спиртный растворъ, отъ прибавленія воды, мутится; млечная мутность долго удерживается въ жидкости, а потомъ, образуются мелкія хлопья, которыя, отъ прибавленія аміака, растворяются. Спиртная настойка бобровой струи окрашивается, отъ прибавленія нѣсколькихъ капель полуторохlorистаго желѣза, въ темно-буровый цвѣтъ. Настойка чернильныхъ орѣшковъ образуетъ бѣловатую мутность. Нерастворимый въ спиртѣ остатокъ бобровой струи растворяется въ хлористоводородной кислотѣ, при слабомъ шипѣніи.

При нагреваніи на платиновой пластинкѣ, бобровая струя вслушивается, распространяетъ непріятный запахъ, потомъ сгораетъ свѣтящимъ пламенемъ и оставляетъ большое количество скважистаго угля.

2. *Castoreum Americanum* s. *Canadense* s. *Anglicum*. Американская, канадская или английская бобровая струя. *Amerikanisches oder Canadisches Biebergel*. Этотъ нисшій сортъ бобровой струи получается отъ американского бобра, *Castor Americanus*.

Мѣшки американского бобра, какъ уже было упомянуто, вообще, меньше мѣшковъ европейскаго бобра. Они длиннѣе, но тоньше и уже. Очертаніе ихъ иногда грушевидное, чаще продолговатое, сплюснутое. Длина мѣшковъ отъ 3 до 4-хъ дюймовъ, ширина — 1 дюймъ, толщина — $\frac{1}{2}$ дюйма. Встрѣчаются и такие мѣ-