

Для врачебнаго употребленія коровье масло промываютъ и мѣсять съ водою до тѣхъ поръ, пока вода не будетъ стекать съ него совсѣмъ безцвѣтною, прозрачною и безвкусною. Такое про-мытое масло, *Butyrum recens insulsum s. insalsum s. lotum*, употребляется, какъ *constituens*, для нѣкоторыхъ мазей, особенно глазныхъ.

STOMACHUS VITULINUS.

Ventriculus intestinalis. Abomasus vitulinus.

Телячій желудокъ или сычугъ.

Labmagen. Caillette. Abomasus.

У рогатаго скота, какъ и у другихъ жвачныхъ животныхъ, имѣется, вмѣсто одного, — четыре желудка, именно: 1) *требушина* — *Rumen*, 2) *сѣтка* — *Reticulum*, 3) *книга* — *Omasus* и 4) *сычугъ* — *Abomasus*, изъ которыхъ одинъ только послѣдній имѣеть, по своему анатомическому строенію и физіологическому отправлению, значеніе собственно желудка. Первые три составляютъ только расширенія пищевріемника и участвуютъ, главнѣйшимъ образомъ, въ процессѣ вторичнаго пережевыванія корма или отрыгнанія жвачки.

Сычугъ, по величинѣ своей, занимаетъ у рогатаго скота второе мѣсто послѣ первого желудка (требушины), имѣеть грушевидную форму и сообщается посредствомъ одного отверстія съ книгою, а посредствомъ другаго — съ двѣнадцатиперстною кишкою. Слизистая оболочка, покрывающая внутреннюю поверхность его, образуетъ множество продольныхъ складокъ, имѣеть розовый цвѣтъ и снабжена множествомъ цилиндрическихъ железокъ, отдѣляющихъ *пепсинъ*, — вещество, играющее главную роль въ процессѣ пищеваренія. Наружная поверхность слизистой оболочки сычуга покрыта тонкимъ слоемъ цилиндрическаго эпителія и, на ощупь, представляется мягкою и нѣсколько бархатистою.

Съ врачебнou цѣлью употребляется только 4-тый телячій же-