

густой слизи. Такимъ образомъ пиявки несутъ *коконы*, наружная оболочка которыхъ принимаетъ въ водѣ губчатый видъ. Изъ этихъ коконовъ, чрезъ нѣсколько времени, выходятъ молодыя пиявки.

Пиявки живутъ въ болотахъ, прудахъ и озерахъ Европы, Азии, Африки и Америки. Онѣ плаваютъ въ водѣ, извиваясь змѣеобразно. Въ воды онѣ ползаютъ подобно гусеницамъ, присасываясь то переднимъ, то заднимъ сосательнымъ кружкомъ и изгибаясь и выпрямляясь попеременно. Находясь въ покоѣ, онѣ придерживаются то однимъ, то обоими сосательными кружками.

Для насъ особенно важенъ одинъ видъ:

SANGUISUGA MEDICINALIS Savigny.

Медицинская пиявка.

Различаютъ *два видоизмѣненія* этого вида, которыхъ прежде считали отдѣльными видами: это *Sanguisuga medicinalis* Savigny и *Sanguisuga officinalis* Savigny.

Var. A. SANGUISUGA MEDICINALIS Savigny.

Hirudo officinalis L.

Медицинская пиявка.

Медицинская пиявка встрѣчается почти во всей Европѣ, преимущественно-же въ сѣверныхъ странахъ, какъ въ Россіи, Швеціи, Даніи, Германіи и Англии.

Ловля пиявокъ производится различнымъ образомъ: изъ мелкой воды ихъ просто вычерпываютъ, а въ болѣе глубокой — ловятъ сѣтями. Иногда люди входятъ въ воду голыми ногами для того, чтобы пиявки къ нимъ присосались, послѣ чего ихъ, тотчасъ-же, снимаютъ.

Медицинская пиявка длиною отъ 3-хъ до 6-ти дюймовъ, вѣсомъ отъ 3β до 3jjj и болѣе. Спина *оливковаго цвѣта*, иногда съ *черноватымъ* или *буроватымъ отпѣнкомъ*. На ней замѣчаются 6 продольныхъ, параллельныхъ полосокъ ржавчиннаго цвѣта; изъ нихъ двѣ среднія полоски нѣсколько болѣе отстоятъ другъ отъ