

друга, такъ что на каждую сторону спины приходится по три полоски. Изъ этихъ трехъ полосокъ та, которая лежитъ всего ближе къ средней линіи, обыкновенно, снабжена нѣсколькими, иногда даже многими, маленькими, узкими, *черными пятнышками* или точками, расположеными въ одинъ продольный рядъ. На средней изъ трехъ полосокъ каждой стороны представляются, мѣстами, большія пятна, почти *округленно-треугольного* и продолговатаго или грушевиднаго, а иногда неправильнo-четыреугольнаго очертанія. Наконецъ, *наружная* полоска, находящаяся у самаго края, обыкновенно, вовсе не имѣть точекъ. Боковые края тѣла желты. Брюхо зеленовато-желтое и, большою частію, съ черными пятнами, которыя сливаются у бокового края въ черную полосу.

Var. B. *SANGUISUGA OFFICINALIS* Savigny.

Hirudo officinalis Geiger.

Обыкновенная или венгерская піявка.

Она живеть въ южной Европѣ, преимущественно въ Венгрии, южной Германіи и южной Франціи.

Обыкновенная піявка длиною отъ 4-хъ до 7-ми дюймовъ. Спина ея *буровато-зеленая*, съ 6-тью продольными полосками ржавчиннаго цвѣта; изъ этихъ полосокъ, самыя наружныя темнѣе другихъ и почти чернаго цвѣта. Брюхо *оливковаго цвета*, *безъ пятенъ*, но съ двумя боковыми черными полосами.

Піявки служать для мѣстнаго кровопусканія. Покупая піявки, должно обращать вниманіе на вышеописанные признаки ихъ. Не должно покупать піявокъ уже сосавшихъ, а также такихъ, которые представляются узловатыми, уродливыми, или измѣненными въ цвѣтѣ, вслѣдствіе болѣзни. Средней величины піявки предпочтитаются большими. Не должно брать піявокъ легче 10-ти и тяжелѣе 50 гранъ, потому что очень молодыя піявки прокусываютъ слишкомъ маленькую ранку, отъ чего послѣдовательное кровотеченіе не можетъ быть достаточно обильно, а слишкомъ большія піявки сосутъ очень мало крови и скоро отпадаютъ. Поэтому піявки средней величины считаются лучшими. Хорошія, здоровыя