

препатствиа: 1) неравностъ въ червуните и изнуренїе; 2) ийчицата като са завързани въ кърпа не можатъ да прїематъ чистъ воздушъ и свѣтлина слънчова; 3) червуйчаата що са измѣтуватъ по напредъ, трябва да гладуватъ нѣколко времи додѣ са измѣтатъ и другите ийчици, а отъ това само по многото ослабяватъ, и до край не можатъ да са оправатъ и да дадеятъ добри пашкули; 4) червуните отъ измѣтуването въ различно време биватъ различни възрастни (боювѣ), а отъ това едини спатъ, други ще заспиватъ, други са савуждатъ, за това и не можатъ да завыятъ въ едно време пашкули, и да са равни помеждъ си въ пашкулите. Едни са качиватъ на храстъ други заспиватъ четвертията сѫнъ, други третията други оставатъ лжнички, като че са отъ вториятъ сѫнъ, които наричатъ пичуви, и вѣрватъ че са са родили отъ другите етици; тѣ никога не можатъ да завыятъ пашкули. Освенъ това, отъ таз разностъ са продлажава животъ на червуните влѣсто 32 дена до 45 или и до 60 дена. Отъ хладината сутрина и вечеръ въ оданите, червуните са принуждени всакой сѫнъ влѣсто 24 часа, да спатъ отъ 4 до 6 и 7 дена, а отъ това изведеніятъ листъ са вкиснува въ отровата имъ (въ крематъ), и имъ развали здравето, отъ което и ставатъ въгарцы, малчици и желтиничави. Освенъ това ийчицата като стоятъ въ пазухите съ кърпата загръватъ са