

лътъ отъ здравите. Ако бы числото на волните да е твърде голѣмо, а болѣстѣта още не са осилюва, то тогава требова да са размѣстатъ и разредаатъ на широко, въздуха да прочистюва, и да е топла одаата, тогава тѣ лесно оздравяватъ.

3. И з н ъ р а в а н е (у сла б ѣ в а н е). Там болѣстѣ са познава споредъ слабостѣта на червиите, и полекото имъ растене. Послѣ това тѣ преставатъ да идѣтъ, ставатъ твърде леки, и често умираатъ, като са задѣшатъ подъ листъ. Тѣзи болѣстѣ по накого бива твърдѣ чувствителна (снана) най повече послѣ третиятъ сѣнъ, червиите до единъ умираатъ.

Четвертата болѣстѣ на кѣприаните черви са показѣва въ това, че тѣ послѣ нѣкоя сѣнъ, повечето послѣ четвъртиятъ, испървенъ ставатъ сѣтливо червенювати, а послѣ тѣмно бѣловати (като калъ); идѣтъ до толкова, колкото и здравите, и порастѣватъ въ еднаква сѣтахъ дѣжина, но биватъ по тѣнки; тѣлото имъ става бистро, и тѣ по нѣкогашъ испускатъ отъ себѣ си по нѣколко капки липкава вода като отъ хрѣма

Тѣй както тези черви никогѣ не забиватъ пашкѣли, то много по добрѣ ще бѣди такива черви да са испъргѣватъ за да са не хаби за тѣхъ листа и времето.

Причината на тѣа болѣстѣ отъ какво дохожда не е извѣстно; обаче мислятъ че ста-