

ва отъ лошиѣте (болните) ийчица, дѣто са са-
брани отъ всакакви пеперѹди.

Патата боластѣ на червѹните са познава
сѣ саѣдѹющѣмѣтѣ начинѣ: преди това червѹните
като да са качиватѣ на хрести, иѣкои отъ
таѣхѣ ставатѣ половина бистри, и иматѣ растѣ
като втасали веки червѹни, обаче тѣ са пжани
сѣ вода, такива червѹни незавиватѣ пашкѹли,
ами ѹмиратѣ.

При това треба още да са прибави, че та-
кива червѹни още като излизатѣ отъ ийчицата
прѣематѣ червеникавѣ цѣѣтѣ (рѣнкѣ), на мѣсто
тѣмнозовавѣ, или ставатѣ червеновати, на ске-
ро посаѣ излизането си отъ ийчицата отъ пжр-
вѣмѣтѣ сжнѣ.

По многопжтно издириоване е познато,
че това произлиза отъ двѣ причинѣ:

1 Когато ийчицата са стоели въ тѣвжрди то-
пло мѣсто и при голѣма кжшна горещина.

2 Когато ийчицата, или младите червѹнече-
та, са приносатѣ отъ тепло мѣсто (право) въ
стѹдено, или отъ стѹдено мѣсто са винсатѣ из-
веднжшѣ въ тепло и горещо. Вко червѹните и
всакога не ѹмиратѣ отъ таа боластѣ, но ос-
таватѣ посаѣ това болнаси до четвѣртятѣ
сжнѣ, и веки не завиватѣ пашкѹли заради това
требова да са гледа ако би боластѣта да са
полви на повечето червѹнчета (ако са червено-
вати) требова да са хвжраатѣ, и отъ дрѹги ий-
чица да са измжтатѣ червѹни.