

сѧ: По прѣдници-тѣ на бубж-тѣ, исподъ рѣзкы-ты, найнапрѣжъ ся явить мургавы уканкы, и по тѣло-то нататъкъ черны пlesкуды, а по нѣкога и рожето на главж-тѣ почернѣе. Заболѣлъ-ты бубы заливаются и запрѣть отъ да ъдѣть и да шявѣть. Ако тая болесть снайде бубж-тѣ слѣдъ дырній ѹ сѣнь, то тя еще може и да запреде и да завіе.

Трета-та епидемія е така наречена-та *дрѣмка* или *черна поразія*. У заболѣлж-тѣ бубж кръвь-та ся разрѣди така, что, ако буба-та е оболѣла въ прывыты си четыре врѣмена, то тя слѣдъ нѣколко дни загыне; снайде ли пакъ тая болесть бубж-тѣ прѣзъ половинж-тѣ на пятый ѹ възрасть, то тя има и да запреде, нѣ отъ кожюрцы-ты ще има малкж облагж, зачтото гы проѣжда черенъ лютъ сокъ изъ разваленж-тѣ орѣдѣлж кръвь. А какъ ся развалия кръвь-та на бубж-тѣ, та ся явява тая болесть, затова ученыты казвать така: нѣкои трошички като прашчета, что ся видѣть у слѣнчевы-ты зары у еднж стањ, вѣтрѣнѣть изъ гнилый смрадъ, та ся вкысвѣть, и когда съ хранж-тѣ или дыханіе-то ся вмѣкнѣть въ утробж-тѣ на червече-то, вкыселять му кръвь-тѣ и ѿ развалиять.

Болесть-та дрѣмка ся познава по това, че буба-та не щѣ да ъде, влѣче ся по лѣсж-тѣ, като піяна, бѣга отъ другы-ты бубы, и лази все по крайща-та на лѣсж-тѣ, дѣто найнапоконъ ся задръжи само съ дѣ нозѣ, что ѹ сѧ подъ корема, па ся обѣси; рѣзкы-ты на заднїх-тѣ половинж на тѣло-то ѹ станѣть замазаны, а прѣдня-та половина на тѣло-то ѹ за много врѣмѧ не си промѣнява бои-тѣ. Изъ уста-та на бубж-тѣ капне по нѣкога по нѣкоя зеленикава капка, а серотина-та ѹ быва кашява, а послѣ рѣдка. Колко-то