

За да се не натискать бубы-ты на лѣсж-тѣ разрѣди
гы по лѣсы-ты на рѣдко, нѣ всякога глядай да до-
хаждать на едно мѣсто все врѣстницы бубы. Ако
всичко това добрѣ пазиши, то рѣдко нѣкога ще ти ся
разболѣшть бубы-ты.

Болны сѣ оныя бубы, които сѣ черникавы или
черны, каквыто чисто ся намиратъ и измежду едва
излучены-ты; послѣ болны сѣ и оныя, които под-
пухнѣшть и отекнѣшть, и които сѣ мазны и мягки, кои-
то ся вкочянуть и вкоравятъ, па стоять бѣлизниковы
и опырлины. Болны-ты бубы, колкото можешъ, по-
скоро врѣгай навѣнъ изъ стањ-тѣ.

А какъ растѣшть и вирѣшть здравы-ты бубы? Г҃ссеничета-та до пять дни сѣ като ситны червей-
чата, отъ девять дни на горѣ заприличать на г҃ссе-
нички, които колко отивать наголѣмѣвать, така что-
то на 28ый день (или и пѣкъено) спорядъ врѣмя-то
достигать до пѣлно-то си развитіе и тогава начинать
да прядѣшть и да вінѣшь една жилка свиленѧ нищка,
която имъ ся точки изъ уста-та. Такыя бубы, кои-
то сѣ начишли да прядѣшть, прѣнеси на особны вѣй-
ки врѣшинѧ, којто трѣбува да си приготвиши отъ
горневы (бѣбовы) храсте, или отъ метлѣ или отъ
глушинѧ. Вѣйки-ты щещь нарядишь вѣсправены по
край стѣны-ты. На тыя бубы, които сѣ начишли вѣ-
че да прядѣшть и да вінѣшь, не трѣбува вече да имъ
ся дава храна. Увити-ти кожюрци (кукули, пашкули)
отъ мѣжскы бубы быватъ въ срѣдѣ-тѣ си поиздуты,
а кожюрци отъ женскы бубы — въ срѣдѣ-тѣ си бы-
вать побѣглѣнїти. У кожюрци отъ японскѣй сой
бубы намиратъ ся и много женскы въ срѣдѣ-тѣ си
издуты. Когато пробирашь кожюрци за сѣмя глядай
еще да отбирашь тыя, на които крайща-та сѣ туп-