

се прѣсича разпространението къмъ изтокъ съ джиновско-гавраиловската крайтундженска равнина. Тукъ влизатъ възвишенията: *Терзименъ*, *Кале-баиръ*, *Казали-баиръ*, *Вързунътъ*, *Кожан-баиръ*, *Куртулмушъ*, *Каяджикъ* и частъ отъ мѣстността *Гюледжикъ*. Най-източното, сравнително по-низко отъ другитѣ възвишения, се казва *Терзименъ*. Скалитѣ на това възвишение сж открити и могатъ да се наблюдаватъ само отъ извѣстна височина на неговитѣ склонове, но по хребета си Терзименъ, освѣтъ дѣто е естествено оголенъ отъ атмосферилитата, основнитѣ пластове на това възвишение сж тѣй сжщо и изкуствено открити и разсѣчени отъ отдавна откритата тукъ тѣй наречена *Джиновска* (Терзименска) *кариера*.

Прѣди да се дойде до хребета, като се отива къмъ него прѣзъ джиновскитѣ лозя се върви по дебелонатрупанъ денудационенъ дилувално-елуваленъ материалъ, изъ подъ който се откриватъ къмъ горния край на лозята ситнозърнести съ варовитѣ цементъ сцементирани пѣсчници. Тия пѣсчници приематъ по разрушената и метаморфозизираната си повърхностъ сивожълтеникъвъ (рѣждивъ) цвѣтъ. По-нагорѣ глинеесто-пѣсчливитѣ пластове прѣминуватъ въ тънко-слоини сиви и рѣждиви мергели. Въ мѣстото, дѣто е открита кариерата, пластоветѣ състоятъ отъ плѣтенъ, свѣтлосивъ, на мѣста жълтеникъвъ и сивочерънъ слабоглинесть варовикъ, който се характеризира съ своя лющуренъ изломъ и съ изобилието въ него на дендритни фигури. Дебелината на отдѣлнитѣ пластове не остава вредъ еднаква, но при все това тукашнитѣ варовици иматъ тънко-слоино сложение. Посоката на пластоветѣ отива отъ с.-и. къмъ ю.-з., а тѣхното падение е къмъ сѣверозападъ. Жгълътъ на падението е  $15^{\circ}$ . (NW hora 22,  $\angle 15^{\circ}$ ). Никакви характерни окаменени не се срѣщатъ въ тоя варовикъ.

На 500 до 600 м. с.-и. отъ кариерата идватъ дискордантно съ поменатитѣ пластове други не толкова характерно напластени червеникави варовици. И тия варовици се характеризиратъ по своята плътностъ и по своя лющуренъ изломъ. Прослѣдятъ ли се пластоветѣ отъ кариерата по нормалния имъ профилъ въ стратиграфски смисълъ на горѣ, то се вижда, че пластоветѣ на гжститѣ варовици слѣдватъ още по-сѣверно и като такива, състоещи отъ материалъ, който по-може да противостои на атмосферилнитѣ разрушителни влияния, тѣ сж се по-запазили и образуватъ самия хребетъ на Терзименъ. Дойде ли се на извѣстна височина на сѣверния склонъ на Терзименъ, забѣлѣзва се, че плътнитѣ варовици прѣминуватъ въ по-млади глинести и мергелни пѣсчници, въ