

открити гнѣзда се приложи изкоренителна мѣрка, отъ която малка полза се извлѣче, защото лозята не сж били добрѣ прѣгледани, вслѣдствие на което още много заразени гнѣзда останали вѣнъ отъ всѣкакви мѣрки — не узнати. Освѣнъ това откриването на филоксерата е станало доста късно. Така напр. нѣкой отъ гнѣздата сж отъ 5—6 години. Въ такъвъ единъ срокъ филоксерата е могла да бжде, както и е, разнесена на толкова много мѣста и тѣй разпрѣстната, щото никаква коренна мѣрка да не може да се прилага, освѣнъ прѣдохранителна.

Пространството на заразенитѣ и изкоренени въ окръга лозя е било 70 декари, въ осемъ гнѣзда, а отъ тая годишното прѣглеждане се намѣри, че филоксерата е взела много по—голѣмъ размѣръ: откриха се нови гнѣзда, освѣнъ старитѣ по—вече отъ 60, които сж прѣстнати на всѣкъ изъ мѣстнитѣ лозя, лежащи на Западъ отъ града и едно ограничено въ мѣстността „Исарлъка“ на Изтокъ отъ града. Всичкитѣ тие гнѣзда заематъ едно пространство по—вече отъ 300 декара лозя. Това показва, колко бърже напѣдва филоксерата. При такава разпространение и мѣстоположение на заразенитѣ гнѣзда нищо не може да спаси сливенскитѣ лозя отъ изсушаване; само може да се продължи сжществуването имъ, съ прѣдохранителни мѣрки, които сж възможни само тогава, когато самò лозарското население се грижи за прилагането имъ. Нъ съ съжаление трѣбва да се забѣлѣжи, че болшинството отъ сливенскитѣ лозари, както и тие изъ цѣлия окръгъ не вѣрвайки въ това, че сжществува филоксера въ лозята имъ и че ще ги изсуши, не само не изпълняватъ мѣркитѣ, които имъ се прѣпорѣчватъ и които би дѣйствиелно попрѣчили на бързото разнасяне на филоксерата, ами дори, като че на пукъ отиватъ противъ тѣхъ, безъ да разбератъ, че съ това сами ускоряватъ загубването на лозята си. И понеже не сж възможни никакви насилни мѣрки, съ които да се накара несъзнателното лозарско население да не спомага само за разпространението на болѣстѣта, безъ