

ность-та е намаляла или почти се види да е изчезнала схвѣтъмъ. На противъ ще употрѣблява горни-тъ разложения за хора много раздразнителни и чувствителни (жени-тъ и дѣтца-та); тѣй тоже и въ болѣсти-тъ въ кои-то чувствителность-та е раздразнена.

Общо правило.

1-о Когн-то долни-тъ разложения сж въ употрѣбление за хора не раздразнителни, за болѣсти въ кои то реакция-та или жизнена-та сила не работи, или за болѣсти кои-то сж твѣрдѣ опасни, или се развиватъ твѣрдѣ скоро, трѣба, въ такива случаи, да се повтѣря взятка-та твѣрдѣ често — додѣ-то на здраво се появи едно подобрене. *Въ най опасни-тъ случаи, като напримѣръ: въ холерата, може да е нужно да се повтѣря взятката всяки петъ минути; силни-тъ обикновенни болѣсти, едно повторение ката два, три или чѣтри часа вжобщѣ е достаточно. Ако едно чувствително подобрене се появи, лѣкарство-то трѣба да се не дава вѣки; но щомъ това подобрене арнише, трѣба лѣкарството да се поднови пакъ. Ако характера-тъ на болѣсть-та се измѣни, то трѣба да се отбере друго едно лѣкарство което да подобава на измѣна-та.*

2-о) Употрѣбляваме ли горни разложения, лѣчимъ ли хронически болѣсти или болни твѣрдѣ чувствителни и раздразнителни, не е дозволе-