

2-о Тѣ се употрѣбляватъ растопени въ прѣварена вода, ако е възможно да се достави, или ако не, то поне да е прѣцедена.

Приготовление-то на лѣкове-тѣ става въобщепо слѣдующа-тъ начинъ: Трѣба да се достави единъ стаканъ или едно шише които да се измити добръ съ топла вода и послѣ испромити съ студена. Тѣзи сждлини не трѣба да сж служили на нѣщо миризливо—тѣ трѣба да сж добръ чисти—както и лжжица-та що ще служи за земание на лѣка-тъ. Прѣмѣрва се вода-та, коя-то въобщепе бива отъ 6 до 8 лжжици, и се поставятъ отъ 6 до 7 зржнца (*globules*) отъ лѣка-тъ, кой-то като се растопи, убжрква се добръ и се захлупва да се не праши.

Въ случай кога-то вода-та е за нѣколко дни, поставя ѝ се по нѣколко капки прѣчистенъ спиртъ, или добра чиста ракиа. Безъ тая мѣрка вода-та може да се развали.

Когато се случи да се промѣни лѣка-тъ, ако би сжща-та сждлина, въ коя-то е билъ по прѣди лѣка-тъ, да се употрѣби пакъ, то тя трѣба да се измие съ топла вода и испромие съ студена, и тогава да се служжтъ. Сжщо ще се постжни и съ лжжица-та. Вжднжжъ тжѣ приготвено лѣкарство-то, то ще се дава на болниа-тъ съ чорбяна лжжица, ако е той възрастентъ, или съ лжжичка отъ сладко ако е маловжзрастентъ. За силни-тъ болѣсти то ще се дава прѣзъ два или три часа. Щомъ се укаже най-малко-то подобрене, лѣкарство-то ще се