

разрѣди; отъ 3 часа ще стане на 4-три, а по послѣ на 5 и на 6.

Въ случай на най-силни-тъ болки, както холера-та, лѣкарство-то ако се дава ката $\frac{1}{4}$ часть, може да се разрѣди на $\frac{1}{2}$ или по послѣ на 1 — постепенно съ подобрене-то. Лѣкарство-то трѣба да се дава сѣкоги тогива когото болниа-тъ на скоро не е пилъ, ни ялъ нѣщо. Въ хронически-тъ болѣсти, лѣкарство-то като се дава сутрѣна и вечеръ, то сутрина болниа-тъ може да го земе единъ часъ прѣди да земе нѣщо за ядение или пианье; вечеръ или единъ часъ прѣди ядение-то или 4 часа послѣ ядение-то — като се смели ястие-то.

Измѣна на лѣкарство-то. — Лѣкарство-то като щѣ се дава тѣй, както се каза, остава да се узиае до колко време то ще слѣдва. Прѣдполага се тукъ че то е избрано добрѣ по омиопатическиа-тъ начинъ.

Въ подобенъ случай обще-то правило е да се слѣдва лѣкарство-то до както се появи една значителна измѣна въ положение-то на болниа-тъ, коя-то тя бива за кратко време въ силни-тъ болѣсти, а медленно въ хронически-тъ,

Въ *силни-тъ болѣсти*, може да се укажътъ двѣ обстоятелства: или по добрѣ става болниа-тъ, или по злѣ. Ако му подобръе отъ пхрва-та лжжица, то лѣкарство-то трѣба да се слѣдва до тогава до като признаци-тъ на болѣсть-та се измѣнятъ и зематъ другъ характеръ, по когото да се