

противенъ случай може да се появѣтъ второстепенни болки, или да се държне къмъ вжтрѣ дѣто болниа-тъ да се изложи въ опасностъ. Слѣдователно дѣтца-та трѣба да се въ една стая не много освѣтлена, и да бжде горѣща 14 р. додѣто начне кожа-та да се бели на малки ситни лѣспички и прѣмине.

Лечение. — Болниа-тъ ще се остави въ лѣглото си, ще е запазенъ отъ свѣтлина-та която може да раздразни йоще чувствителность-та на очитѣ; ще е покритъ добрѣ, но умѣрено. Отъ прѣтопление-то може да му се случи нѣкое кржвостечение къмъ глава-та, къмъ гърди-тѣ или да се спре изривание-то на сипанца-та. Топлина-та на стая-та, както казахме, трѣба да бжде приятна и постоянна.

Както за сички-тѣ заразителни болѣсти, уединение-то на болниа-тъ е едно отъ главни-тѣ нѣща, кое-то трѣба да се земе подъ внимание. Забѣлѣжено е че най лесна-та зараза става въ време на лѣущение-то.

Когато тая болѣсть вжрлува епидемически **пулсат.** дадена на два или три дена по една взятка сутрѣна, може да запази тѣзи що сж наклонни да паднѣтъ болни — отъ да не бждѣтъ.

Лещенка-та, както казахме, е вжобще епидемическа и прилѣпчева; тя вжобще не лови освѣнь веднѣжъ человек-а-тъ. Тя сама по себе си не е опасна, нейни-тѣ слѣдствия по нѣкоги ставатъ опасни — и то на по вжзрастни-тѣ дѣтца. За това време-то що има болниа-тъ да прѣкара въ стая-та или