

кожна-та червенина се изриватъ наедно и едни ситни пшчици кои-то стръжжтъ като брусъ ; въ противенъ случай кожа-та бива червена и лжекава като атласъ.

Тя, като е една отъ най смъртоносни-тѣ болѣсти, се явява въ начало съ една силна трѣска и едно твърдѣ затруднително гърлоболие. Трудность-та на прѣглъщание-то и да си мърда врата-тъ болниа-тъ, показва негово-то начало. Гърло-то бива червено-темно и языка-тъ прѣставлява едни характеристически издатки: мѣза на малина. Подиръ два или три дена, синаница-та начнава да излиза — като начне отъ врата-тъ и се раздаде по сичка-та снага. Пятни-тѣ кои-то биватъ по нѣкоги по червени, а по нѣкоги по темни, се распространяватъ тѣй щото, чрѣзъ сжединение-то помѣжду си, обличатъ почти сичко то тѣло що става червено като ракъ. Характера-тъ на тѣзи болѣсть бива въобще твърдѣ тѣжжкъ, тѣй щото въ начало йоще се явяватъ спасми, бжлування, джлбокоспание и пр. — Отъ 5-тъ до 6-тъ день червенина-та намалява, трѣска-та отпада и гърлоболие-то умѣква. Кожа-та начнава веки да се бели.

Въ кратце брусница-та се узнава отъ четири-тѣ главни точки, кои-то сж: гърлоболие-то, языка-тъ „малиновъ“, голѣма-та горѣщина и изривание-то.

Брусница-та е прилѣпчива и епидемическа. Тя се явява особно въ пролѣтъ или прѣзъ лѣто-то, и закача повѣче дѣтца-та отъ 3 до 10 години.

Понеже болѣсть-та е тѣшка и опасна по ней-