

ни-тъ разни появления, то се изисква повърение-то на болниа-тъ на единъ добър лѣкарь. Въ противенъ случай, ще изложемъ тукъ най необходими-тъ срѣдства.

Лѣчение. — Топлина-та на стая-та не ще бѫде повърче отъ 14 до 16 градоса %. Съ прѣдосторожность ще се отваря единъ прозорецъ за промѣнение на воздуха-тъ отъ време на време. Болниа-тъ ще е покритъ умѣренно — безъ да е прѣтрупанъ отъ дрѣхи. Той ще бѫде поставенъ подъ диета и подъ умѣкителни питиета.

Първа-та мѣрка що трѣба да се земне е уединение-то на болниа-тъ отъ други-тъ дѣтца. Въ епидемическо време, за прѣдвардване на дѣтца-та, може да се употреби слѣдующе-то срѣдство: една или двѣ капки отъ тентура белладона въ 60 или 100 драма вода — отъ коя-то ще се дава на по възрастни-тъ по една чорбяна лжжица прѣзъ денъ, а на по малки-тъ по една малка лжжица.

Въ начало на болѣсть-та **беллад.** въ размѣна съ **акон.** сѫ достаточни. Кога-то синаница-та се изрива злѣ дай **сулф.** или **бронен.** Ако сила-та на гжрло-то се умножава и става прѣодолителна точка на болѣсть-та, дай **мерк.** въ размѣна съ **беллад.** или **аписъ.** — Щомъ малко гжрло-то начне да почернява и да клони кѫмъ гангrena, дай **арсен.** и **асид. мурнат.** — Противъ задушници-тъ употреби **мерк.** и **русь.** — Противъ страдания-та на мозака-тъ съ бжлнуване, дай **беллад.**; противъ