

акон. и умѣкчителни питиета; ако съществуватъ мозачни признаци; **беллад.**; нервически или тифически признаци: **брион, русъ**; ако гнойници-тъ гноясватъ много: **меркуръ**; ако тѣ почернѣватъ: **асид.-му., арс.**

Тестъ рекомандува слѣдуище-то лѣчение кое-то се потвърждава йоще и отъ други лѣкари:

Йоще въ начало-то — въ прѣдварителни-тъ знакове на сипаница-та, той дава **зинк.** (**№ 30-6** зрана, 30 драма вода) три или четири лъжици въ день (за дѣтца-та една малка лъжичка). чрѣзъ кое-то сполучва да спре изривание-то на сипаница-та. — До една недѣля послѣ болния-тъ трѣба да се пази да се не изложи на хладенъ въздухъ.

Когато пъпки-тъ начинатъ да излизатъ и да растѣтъ, горньо-то лѣчение като нѣма никакво дѣйствие вѣки, той дава **кауст.** (**№ 30, 8** зранца въ 40 др. вода) сутрѣна двѣ лъжици въ растояние на 4 часа; а подиръ плалнѣ, **мерк.-кор.** **№ 30** — тоже двѣ лъжици до вечерь-та; По този начинъ тоза лѣчение ще се слѣдва догдѣ-то гнойници-тъ начинатъ да прѣгарѣтъ.

Ако изриванието на сипаницата става не редовно или начне да се тегли на вжтрѣ; ако пъпки-тъ начинатъ да почернѣватъ и да се пълнятъ съ кръвь — **Сулоф.** (**№ 12, 8** зранца въ 40 др. вода) по една лъжица сѣки часъ.