

тржки по тъло-то и отъ помръзване на краища-та. Болниа-тъ настръхнува и начнава да тръпери. Пулса-тъ е малкъ и твърдъ. — Послѣ това наслѣдва горѣщина-та коя-то се усилва малко по малко, като пулса-тъ отбива често, лицето се забрежда, главоболие-то се засилва и жаждата умножава. — Въ продолжение на 3, 4 часа пулса-тъ, главоболие-то и жаждата намаляватъ, и пота-тъ начнава да иде—съ когото се свиршила тръска-та.

Периодическа-та тръска, коя-то вжобще се мисли за нищо, е една болѣсть твърдъ сериозна; продлѣжена джлго време, тя растройва цѣлия организъм—най-наче далака-тъ и черниа-тъ дробъ.

Лѣчение.—Когато нѣкой е принуденъ да прибивава въ тръскаво място, то той тръба да се подложи на нѣкои игиенически правила. Храна-та му тръба да бѫде хранителна, дрѣхи-тѣ му тошли и леки съвременно. Щомъ мржкне той тръба да се прибира въ дома-тъ си, и нощѣмъ да затваря прозорици-тѣ. Ще спи въ най суха-та и най висока стая, като се пази отъ сѣка простудка. Тѣзи мѣрки ако и да не сѫ въ положение дѣто да отблѣснатъ тръска-та, тѣ поне даватъ време на организма-тъ да ѹ противостой.

Въ време на студа-тъ болниа-тъ тръба да се стопли било то съ завивка, било то съ тошли кермиди или съ нѣкое топло изъ вътрѣ нитие. Когато горѣщина-та нападне, напротивъ тогава му се отнима това що му докарва тѣгота, и му се да-