

зватъ расхладителни питиета, Въ време на пота-тъ трѣба да са бди щото болниа-тъ да се не простуди.

Ако трѣска-та е катадневна, то трѣба да се бди на 7-тъ и на 14-тъ день, ако тя е прѣстанжла, да не би дасе повжрне; ако би да се забѣлѣже подобно нѣщо, то независно трѣба да се употреби тѣзи лѣкарства що се поддѣствували да я прѣсѣчтъ;—ако тя дохожда на два дни то трѣба да се опасаваме отъ 14 и 28 день, като считаме отъ тогава отъ коги-то е прѣстанжла трѣска-та;—ако тя дохожда ка-та три дни, то трѣба да се наблюдава 21 и 42 день. — Най строга-та диета трѣба да става най паче въ тѣзи времена, и болниа-тъ щомъ досети най малкиа-тъ знакъ отъ трѣска, то той не трѣба да се колибае никакъ отъ да употреби пакъ сѫщи-тѣ лѣкарства кои-то му се спомогнли по прѣди. Това показва че трѣска-та ако и да е прѣстанжла отъ да се явява, не е йоще сѫвршенно из-чезнжла отъ да не смущава организматъ при една най малка причина.

Въ едно блатисто и влажно място когато трѣска-та влада, дай **шина, тентуръ меръ** (*teinture mère*) 3-4 капки на веднажъ сѣки 12 часа. Ако въ 48 часа болниа-тъ не се подобри чувстиви-телно, то дай **инек.** №12 3-4 зранца на вжд-нажъ, и 12 часа подиръ дай пакъ **шина.** Тѣзи двѣ лѣкарства може да се даджтъ въ размѣна до-дѣто подобрението се появи.

Едно отъ най мѫчни-тѣ нѣща въ лѣкувание-то