

тъ да е злокачественъ. Смжръ-та дохожда въ време на трѣска-та; ако първиа-тъ и вториа-тъ пътъ, болниа-тъ се отхрве, то третиа-тъ пришадокъ е неизменно смжртоносенъ.

За подобни трѣски лѣкаръ-та е необходимъ. Но додѣто дойде той, **сулфато** (1 часть сулф. и 9 части захаръ — стрити добре съ продолжение до единъ частъ). Одѣ това приготовление дай послѣ на сѣки два часа по 10 жита.

Распалителна Трѣска.

Подѣ това название се именува трѣска-та която не се отнася на никакво вѫнканно или вѫтрѣчино ржспаление. Тя понѣкоги дохожда извѣжднѣжъ, а по нѣкоги съ нѣкои прѣдварителни знакове, като главоболие, залѣзъ, безпокойствие и прч.; на конецъ дохожда една студенина подиръ която напада горѣщина-та; лице-то става забруднено и очи-тѣ свѣтликави и сѫзовати; диханіе-то се забжрзява и жаждата се умножава; затяганіе и рѣдкостъ на пижочь-та, която е темна-червена, се явяватъ. При сичко това болниа-тъ съхранява сили-тѣ си.

Въ повѣче-то случаѣ **акон.** (отъ 3 или 4 часа по една лжжица) е достаточенъ. Но ако би да се появяятъ признания кѫмъ глава-та, като: сѫниливостъ денѣмъ, а безсѫние нощѣмъ, или сѫнь беспокоенъ съ стрѣсканіе, спазми, бжлнуваніе, и пр., то **беллад.** е необходима. Ако при горни-тѣ се