

послѣ се явява ката вечерь една медленна трѣска; потъ на изнеможение нощемъ, значителна сухотъ и смърть.

Лѣкове-тѣ що може да употрѣби нѣкой за тая болѣсть сж: **калк.-карб., фосф-ас. и карб.-веж.**

Дай пжрво **калк.** № 12 (6 зр. въ 30 др. вода) по $1\frac{1}{2}$ лжжица сѣки 4 часа (за дѣтца-та една лжжичка отъ сладко). Щомъ подобръние-то се появи, даванието на лѣкарство-то ще се разрѣди. Но щомъ подобръние-то прѣстане и болѣсть-та се появи пакъ както изъ начало (нѣщо що се случва), дай **фосф. — ас.** на мѣсто **калкар.** по сжщия-тъ начинъ. — Ако болѣсть-та се противи на тѣзи двѣ лѣкарства, (нѣщо рѣдко), то тогива дай **карб.-веж.** № 30 по една лжжица сѣки 4-три часа.

Когато болниа-тъ начне да се поправѣж, трѣба тоже голѣмо внимание; той трѣба да се въздържа отъ сѣко тѣжко ястие — най паче отъ сладки, тѣстени и пржжени нѣща.

Холера.

Безъ да описваме признаци-тѣ на тая болѣсть, коя-то е позната почти отъ сѣкиго когато владѣе, ще кажемъ само че въ холерическо време человекъ не трѣба да излиза никакъ на гладно сжрце; ако не друго то поне малко хлѣбъ трѣба да закуса сутрѣна.