

Лѣчение.— Въ случай когато холера-та хвати нѣкого извѣднѣжъ и го обсили, пѣрво-то лѣкарство е **камф., тент.-меръ**; 2 канки на една бучка захаръ сѣки $\frac{1}{4}$ часъ. — Ако болниа-тъ истине, посинѣе и отпадне съ силно свивание на жили-тѣ, то лѣкарство-то може да се повтѣря отъ 5 минути на 5. Щомъ се появи потъ, лѣкарство-то се спира. Холера-та по тозъ начинъ се унищожѣва схвѣршенно; изискѣ се само скоро да се дѣйствуѣ прѣди да се яѣи бѣлвочъ или дрисжкъ, въ кое-то време това лѣкарство не е вѣки подобно. — Ако бѣлвочѣа-тъ е по често отъ дрисжка-тъ, то дай **ипек.** № 6 (10 зр. въ 30 др. вода) по една лжжица сѣки $\frac{1}{2}$ часъ. — Но ако би бѣлвочѣа-тъ да е по малко и да има силни болки по корема-тъ съ бѣлѣ дрисжкъ, то дай **фосф.-ас.** № 6 (8 зр. въ 30 др. вода) по една лжжица сѣки часъ.

Ако гласа-тъ на болниа-тъ отслабнѣе и прѣсипне, съ слабостъ голѣма, очи хлѣтнѣжти, леденъ студъ по снага-та най-паче на крака-та, на рѣцѣ-тѣ, на лице-то и на языка-тъ, съ студенъ потъ; бѣлвочъ и дрисжкъ зеленикѣѣ и бѣлизнѣѣ като оризена вода; пулсъ едѣамъ чувствителенъ и дихание трудно, то дай **вератр.-алѣ.** № 3 (10 зр. въ 40 др. вода) по една лжжица сѣки 10 минути; щомъ подобрѣние-то се появи отъ $\frac{1}{2}$ часъ на $\frac{1}{2}$. — Ако сѣ появиѣтъ болки съ свивание на жили-тѣ, то дай въ размѣна съ **верт., купр.-м.** № 12 сѣки часъ по една лжжица (единъ пѣтъ отъ едно-