

то, а друдъ отъ друго-то). Щомъ свивание-то на жили-тѣ прѣстане, то употрѣби само **верт.**, ако е нужно. — Ако би при горни-тѣ признаци се появи едно голѣмо безпокойствие щото болниа-тѣ се хвжрля, се открива, излиза отъ лѣгло-то си; ако и йоще се жалва че подъ лжжичка-та му се нахожда като единъ огньъ що гори, то прѣсѣчи сѣко лѣкарство и дай **арс. № 6** (6 зр. въ 30 др. вода) по една лжжица сѣки $\frac{1}{2}$ часъ.

Ако тѣло-то посинѣе и истини като ледъ; ако очи-тѣ повѣхнхтъ и хлхтххтъ тжй щото само бѣло-то на око-то се глѣда, съ гласъ изгубенъ, дихание трудно, дххъ студенъ и пулсъ нечувствителенъ, дай **карб.-веж. № 6** (10 зр. въ 40 др. вода) по една лжжица сѣки 10 минути. Ако въ продължение на единъ часъ, това лѣкарство не произведе никакво дѣйствие, то дай **ас.-идроспан. № 3** (3 зр. въ 20 др. вода) по една малка лжжичка отъ $\frac{1}{4}$ часъ на $\frac{1}{4}$ часъ.

Тѣзи сж най главни-тѣ и най необходими-тѣ лѣкарства що може да употрѣби нѣкой въ врѣме на холера-та.

ЗАВЪЛ. — Херингъ рекомандува СУЛФ. изъ начало: ако има дрисжкъ на сѣко излизване по една лжжица; ако би дрисжка-тѣ да е сждруженъ отъ бжлвочъ, свивание на жили-тѣ, студъ и лице синкаво, то сѣки $\frac{1}{2}$ часъ по една лжжица. — Грамоази въ сѣки случай рекомандува АКОН.

Предпазительно срѣдство. — Сѣки 8 дни земай по единъ пхтъ отъ слѣдуиущи-тѣ лѣкарства по слѣдуиущиа-тѣ начинъ: **Верат. № 3** (3 зр.) два часа прѣди да ядешъ. — Три дни послѣ; **купр.**