

— На конецъ когато нѣма никакво свѣдение, то подиръ **калк.** и **белл.**, може да се даде **арж.-нитр.**, най-паче на тѣзи що страдатъ отъ ревматизмъ.

Разумѣва се че ако едно отъ горѣказани-тѣ лѣкарства докара полза, то трѣба да се повтори подъ едно **Лѣ** по горно, като се разрѣди сѫвременно и даването на лѣкарство-то въ двойно растояние. Ако болѣстъта не зема отъ никакво лѣкарство, то въ същи случай **ланц.** трѣба да бѫде най послѣдното лѣкарство. — Трѣба тоже да се знае че при употребление-то на **белл.**, и **ланц.** и проч., припадоци-тѣ ставатъ по части и по силни изъ начало, като изъ послѣ начинаватъ да отпадатъ.

### Парализна.

Подъ дума-та парализа се разумѣва тѣ що назъзваватъ *зелъ му се* языка-тѣ, крака-тѣ, ръка-та и проч. Происхождение-то на тайл болѣсть е нѣкоя врѣда на мозака-тѣ, на грѣбната-та нерва, или на нѣкоя друга нерва. Най тѣжки-тѣ случаи сѫ тѣзи кои-то сѫ слѣдствие на една апоплексия, на единъ ревматизмъ, на една отрова, на едно нервическо страдание, сифилитическо, скорбутическо, или на едно страдание отъ тѣжка-та болѣсть — както и отъ кожна нѣкоя болѣсть. — Лѣчение-то й не принадлежи на съкиго, понеже по нѣкоги най добритѣ лѣкари не могатъ, при сичко-то искуство, нищо да направятъ.

**Лѣчение.**—На една скорошна парализа, що е слѣдствие на една апоплексия, **арн.** е коя-то