

зи лъкарства не сж достаточни, то дай **дулк.** № 12 три лжжици въ день. Тукъ йоще сж полезни лъкарства-та: **кант., пулс., арс., камф.**

Противъ парализиа що е слѣдствие на едно ржкублтудие, на едно съменно течение или на едно кржвотечение, то употреби слѣдующитѣ лъкарства: изъ начало дай въ размѣна **пукс.-в.** и **сулф.**, единъ день отъ едно-то, другъ отъ друго-то; послѣ, ако е нуждно, **ини.**; по послѣ **кокул.**, а най сетнѣ **ферр.** Мѣжду сѣко лъкарство ще се оставя по една недѣля растояние.

* Ако тя е слѣдствие на едно **спасмодическо страдание**, то дай **кауст.** и **куир.** въ размѣна; сетнѣ, ако е нуждно **калик.** и **силис.** тоже въ размѣна; на конецъ **белл.** сетнѣ **кокул.**, а най сетнѣ **сикут.** Распусъ до една седмица мѣжду сѣко лъкарство,

Ако тя е слѣдствие на една **кожна болѣсть** що се е држиняла на вхтрѣ, то дай **кауст.**, а послѣ **сулф.**

Ако тя е слѣдствие на едно пианство, дай въ размѣна **пукс.-в.** и **сулф.**

Когато парализиа-та обладава само **една-та страна** на тѣло-то (*hémiplégie*), дай първо **кауст.** № 30 (7 зр. въ 40 др. вода) по една или двѣ лжжици въ день спорѣдъ ветхина-та на болѣсть-та. Ако **кауст.** не произведе подобрение, то дай, послѣ една недѣля растояние, **кокул.** по сжицата на цицъ. **Идумб.** може теже да са даде по сжицата