

тъ начинъ., ако **кокул.** е недостаточенъ. — На пжлнокржвнитѣ и червени хора съ очи сини, дай изъ начало **белл.** N^o 30 въ размѣна съ **арж.-нитр.** N^o 12, единъ день отъ едно-то, другъ отъ друго-то. — На хора що сж сухи и слаби съ тѣло-служение злжчесто, дай **лаин.** N^o 30. Ако само то не произведе никакво подобрене, то дай го въ размѣна съ **кауст.** N^o 30

Ако парализиа-та е **накржстъ,** то е дѣсна-та ржка и лѣвиа-тъ кракъ, дай **калк.** N^o 30 (7 зр. въ 40 др. вода). Ако то не произведе добро дѣйствиe, то дай **лаин.** и **силес.** N^o 30 въ размѣна — по двѣ лжжици ката день отъ сѣко едно.

Парализиа на **долни-тѣ членове** (*paraplesie*) и изцѣло на крака-та. Спорѣдъ Лакузона дай пжрво **кокул.** N^o 30 (6 зр. въ 30 др. вода) сѣка сутрѣна по една лжжица. Ако това лѣкарство не подѣйствува, то дай **пукс.-в.** N^o 30, подиръ една недѣля расстояние, ката вечеръ по една лжжица. Ако и това лѣкарство не спомогне, то дай въ размѣна **белл.** и **рус.** по двѣ лжжици сѣки день отъ сѣко едно. На конецъ може да се даде и **плумб.**

Противъ парализиа-та на **колѣни-тѣ,** дай **анакард. ориант.** N^o 30 (7 зр. въ 40 др. вода) сутрѣна и вечеръ по една лжжица, въ недостатокъ може да се даде **бербер.-вулг.** N^o 12 или **олеандеръ.**

Ако парализиа-та сжществува **доло въ кра-**