

Кожно и подкожно распаление

(*Abcés*).

Въ страдание-то на едно подобно распаление се забѣлѣзва: подутие съ горѣние, червенина и болки. Въ начало по нѣкоги болниа-тъ досеща студени тръпки, безпокойствие и трѣска съ жедостъ много или малко.

Лѣчение.— Въ начало на едно подобно распаление употрѣби катапласми изъ вжнъ отъ ленено сѣме; изъ вжтрѣ, ако кожа-та е червенотемна, горѣща и обнжта: **белл.** N^o 12 сѣки четири часа по една лжжица.— Ако подутие-то е достаточно и кораво: **мерк.** по сжщия-тъ начинъ.— Ако то е червеноясно или блѣдо, кораво съ кожа обнжта и лжекава, съ силни болки въ сѣко движение: **брион.** N^o 12.— Ако болниа-тъ досеща болки що горѣтъ като огънь, или ако подутие-то клони на гангрениясване: **арс.** сѣки четири часа по една малка лжжичка.— Щомъ се досети че подутие-то е начало да бере, то дай **силис.** или **епаръ-сул.** N^o 30 отъ 3 до 4 лжжици въ 24 часа, и продължававай додѣто се пробие. Щомъ се пробие, дай: **сулоф.** N^o 30 по сжщия-тъ начинъ какъ **силис.**— Подиръ **сулоф.** ако гнойа-тъ е червеникавъ съ сжкръвица: **калк.**: ако той е гжстъ: **кауст.**— На конецъ ако той е вонѣщъ: **сени.** N^o 30.— Когато раната е обиколена отъ едно червено распаление: **мерк.**— Ако гнойа-тъ е изобилень: **шши.**