

Когато подутие-то се пробие и гноя-тъ му мѣ-
за на бѣло сирене съ щрѣкание и горѣщи болки
на рана-та, съ червенина що се простира на око-
ло кжмъ здрави-тъ мѣста, то дай **белл.** N^o 12 съ-
ки четири часа по една малка лжжичка,— Ако ка-
то се похвати подутие-то, болки-тъ се разбуждагъ
съ щрѣкание, и гноя-тъ е водокржавъ и вонѣщъ:
русь N^o 12 по сжщия-тъ начинъ какъ беля. —
Ако гноя-тъ е бѣлизнавъ и воденъ, и болки-тъ се
раздаватъ на далечъ: **аса-фет.** N^o 12 съки 4-три
часа.— Ако течение-то се продължи много и се по-
яви една малка трѣска, или ако рана-та се измѣ-
ни на фистула: **фосф.** N^o 12 по една лжжица су-
трѣна и вечеръ.— Ако **фосф.** не е достаточенъ,
дай послѣ и **силне.** по сжщия-тъ начинъ.

Въ подобенъ случай не трѣба да се забравя и
отпуца тѣлесно-то расположение, кое-то често би-
ва причина на единъ лошавъ гной. Ако болниа-
тъ има живиничево расположение, то подобава:
калк., русь, силне.; въ случай на сифилити-
ческо страдание: **аур.**; въ случай на слабостъ и
немощъ: **ини.** и **ферр.**; ако страдающе-то мѣс-
то е безнеомощно: **енаръ, мерк.**; ако не сжще-
ствува жизнена реакция: **фосф.** и **русь.**

Распадение на прѣститѣ около поктитѣ (*Panaris*)

Въ едно подобно страдание употреби катапла-
сми отъ ленено сѣме изъ вжнъ; а отъ вжтрѣ изъ